

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modo de uso

(En parcelas) se recomienda incorporar en el suelo y mezclar. Ideal para abonar pastos y plantas
Para más información puedes consultar nuestro sitio web.

www.bioverdemex.com

Toxicidad

No fitotóxico en las dosis (No se recomienda plantar al 100%)

Dosis recomendada

En parcela, se recomiendan 20 toneladas por ha.
En pasto, 3 kilos por metro cuadrado
En sustrato, de 20% a 30%

Consulte a su asesor agrícola.*

Microorganismos Benéficos

Actinomyces sp.	70 000 UFC/g
Micrococcus sp	600 000 UFC/g
Streptomyces sp	1 100 000 UFC/g
Azotobacter sp	200 000 UFC/g
Pseudomonas fluorescens	Pres. en 25g de compost
Citrobacter freundii	Pres. en 25g de compost
Ochrobactrum anthropi	30,000 UFC/g
Bacillus Subtilius	2'500,000 UFC/g

Composición de metales pesados

	Rangos	
Aluminio, Al ppm	7.01	15.3
Magnesio, Mn ppm	400	600
Cobre, Cu ppm	13	15
Zinc, Zn ppm	75	200
Boro, B ppm		<0.032
Materia Orgánica, %	35	45
Relación C:N	22.6	26.7
pH	7.3	8.2
Conductividad eléctrica 5.96 mmhos/cm	2.4	3

Análisis Químico

	Rangos	
Humedad (%)	20	25
Nitrógeno, N%	1.4	1.9
Fósforo, P%	0.6	0.9
Potasio, K%	2.2	2.5
Azufre, S%	0.9	3
Magnesio, Mg%	1.1	1.5
Calcio, Ca%	2.8	3.2
Sodio Na ppm	0.7	1.45
Hierro, Fe ppm	5.6	14.2

¿Cómo puedo aplicar composta a mi cultivo?

- 1 **La composta** la podemos aplicar al boleó en la parcela antes de preparar la tierra.
- 2 Aplicación en el surco **antes o durante la siembra**.
- 3 **En plantas** como por ejemplo berries se puede aplicar año con año al surco de la parcela.
- 4 **En arboles** su aplicación es en la zona de goteo.
- 5 Los tiempos de aplicación los recomendamos realizarlo una vez por año, **principalmente antes de la siembra** para cultivos de cosecha corta y antes de lluvias para árboles frutales.
- 6 Se puede aplicar al boleó en **pastos o césped**.

BIO VERDE MEX



www.bioverdemex.com

(33) 1887 0813

Para más información puedes consultar nuestros sitio web y redes sociales.

